☐ PFIZER-BIONTECH COVID 19 ☐ MODERNA COVID-19 ☐ NUVAXOVID COVID-19

الاسم و النسب _____

يوم الازدياد _____ تاريخ أول تطعيم _____

قبل التطعيم الذي تم إجراؤه بمناسبة الإعطاء الأول ، حدثت اختلافات (الحمل ، الإرضاع ، نتائج اختبارات عدوى SARS-Cov-2 ، العلاجات الجديدة ، الخ ...) ☐نعم ☐ لا

(إذا كانت الإجابة نعم فحدد الاختلافات): _____

_____

بعد إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح ، أظهر رفض عيني موقع الإعطاء (حكة ، حمى ، الخ). ☐نعم ☐ لا

اذا الإجابة كانت نعم،

نوع رد الفعل: _____

الفترة بين الإعطاء وحدوث الفعل الضار: _____

في حالة حدوث رد فعل عكسي ، قم أيضًا بملء الأجزاء التالية

ردود الفعل السيئة السابقة للقاحات: ☐نعم ☐ لا

اذا الإجابة كانت نعم،

اسم اللقاح الذي أعطى الفعل: _____

نوع رد الفعل: _____ التاريخ _____

ردود الفعل التحسسية الشديدة السابقة (التأق) لسبب غير معروف: ☐نعم ☐ لا

اذا كانت الإجابة نعم

نوع رد الفعل _____ التاريخ _____

الفعالات المناعية الضارة السابقة: ☐نعم ☐ لا

اذا الإجابة كانت نعم،

- اسم الدواء _____ نوع رد الفعل _____
- اسم الدواء _____ نوع رد الفعل _____
- اسم الدواء _____ نوع رد الفعل _____

يشتكي من الخافي الجينة الجهازية: ☐نعم ☐ لا

يعاني من الربو القصبي غير المنضبط" ، مما يعني أنه على الرغم من العلاج الأساسي يتطلب الاستخدام المتكرر (> 2-3 مرات / أسبوع) من الساليتامول يوميا:

☐نعم ☐ لا

التاريخ و المدينة : _____/_____/_____, _____

توقيع عامل الرعاية الصحية / التطعيم: _____

استنتاجات من قبل مشغل الرعاية الصحية الذي يجمع التاريخ:

☐قبل التطعيم بدون تناقضات ☐قبل التطعيم في منشأة يخضعون لـ 30 دقيقة. الملاحظة

توقيع عامل الرعاية الصحية: _____

في حال وظف في حالة حدوث فاعل مرضي يتجاوب عند الجرعة الأولى ، التطعيم عن طريق تمديد وقت الانتظار إلى 30 دقيقة دون مزيد من الاختبارات والتحقيقات ، SIAAIC / AAIITO (2021 في حال قرار الشباب في رفع تحرس مع مم ، أرسل إلى بيئة حماية مجهولة.

يمكن ملء هذا النموذج التحضيري لإعطاء جرعة لقاح Covid-19 الثاني للمصل الحضري وفقا للمرفق الاجتماعية والصحية من قبل أخصائي الرعاية الصحية على اتصال مع المريض في الأيام التالية لإعطاء الجرعة الأولى.