

È pertanto importante:

- **non avere comportamenti a rischio**

Se dovessi contrarre la malattia, non aver paura a rispondere alle nostre domande, proteggeremo sempre il tuo anonimato.

Il nostro obiettivo è quello di bloccare il virus.

anche su eventuali contatti a rischio
è possibile scrivere sui seguenti indirizzi e-mail:

malattieinfettiveigiene.empoli
@uslcentro.toscana.it

malattieinfettiveigiene.firenze
@uslcentro.toscana.it

malattieinfettiveigiene.firenzenordovest
@uslcentro.toscana.it

malattieinfettiveigiene.firenzesudest
@uslcentro.toscana.it

malattieinfettive.mugello
@uslcentro.toscana.it

malattieinfettiveigiene.prato
@uslcentro.toscana.it

segnalazioni.malattieinfettive.pistoia
@uslcentro.toscana.it

VAIOLO DELLE SCIMMIE (MONKEY POX)

COME SI TRASMETTE
SINTOMI E PREVENZIONE



A cura di
DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI
TECNICO SANITARIE
SS.OO.SS.DD. Attività di
Assistenza sanitaria

CHE COS'È MONKEY POX

È una malattia che si trasmette da persona a persona, ed è causata da un virus simile a quello del Vaiolo, ma meno grave, si trasmette attraverso contatto stretto con la persona sintomatica:

- contatto faccia a faccia per un periodo prolungato di tempo
- contatto diretto con lesioni della pelle e delle mucose, con il contatto dei fluidi corporei
- rapporti sessuali
- scambio di oggetti contaminati (asciugamani, indumenti, lenzuola, stoviglie)

L'utilizzo del profilattico, che resta fondamentale per proteggersi da molte malattie a trasmissione sessuale, come Epatiti, Hiv, Sifilide, Gonorrea etc, potrebbe non essere sufficiente.

SINTOMI

- febbre
- sintomi simil influenzali
- ingrossamento dei linfonodi
- comparsa di vescicole
- infiammazione e dolore a livello rettale

Se dovessero comparire questi sintomi (anche uno solo) ed hai avuto contatto con persone delle quali sai che hanno avuto la malattia o hai avuto comportamenti "a rischio", contatta il tuo medico di fiducia, il quale potrà indirizzarti verso un centro specializzato nella diagnosi delle malattie infettive.

Nella maggior parte dei casi la malattia dura da 2 a 4 settimane. Si è contagiosi dal momento in cui iniziano i sintomi, nel caso di comparsa delle sole vescicole si è infettivi dal giorno precedente. Si è guariti alla scomparsa di tutte le croste.

PER QUESTO MOTIVO È IMPORTANTE

- autoisolarsi e non partecipare ad eventi
- astenersi dall'attività sessuale
- evitare contatti stretti o intimi
- avvisare i contatti più stretti e i partner sessuali
- lavare spesso le mani

VACCINAZIONI

Al momento, la modalità di contagio e la velocità di diffusione, così come l'efficacia delle misure non farmacologiche fanno escludere la necessità di una campagna vaccinale di massa. Tenuto conto dell'attuale scenario epidemico, la vaccinazione, come profilassi pre-esposizione e post-esposizione a partire dai 18 anni di età, verrà offerta inizialmente alle categorie di cui alla circolare Ministeriale 0035365-05/08/2022

Nel caso ti venga diagnosticato il Vaiolo delle Scimmie (Monkeypox), verrai contattato/a dall' U.F.C. di Igiene Pubblica e Nutrizione, l'operatore sanitario (assistente sanitario o medico) ti farà alcune importanti domande che hanno il solo scopo di individuare precocemente i contatti a rischio, in modo tale da poter bloccare la catena del contagio.

Verranno fatte anche domande relative ai 21 giorni precedenti l'esordio della malattia, queste servono a poter risalire alla fonte del contagio, così da riuscire a capire quante altre persone possono essere state esposte al rischio di malattia.