


POST PARTUM

Il periodo post partum è un momento fondamentale per il recupero delle vaccinazioni mancanti considerando che **l'allattamento non costituisce controindicazione** ad alcuna vaccinazione, soprattutto per le vaccinazioni contro Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella.



PER INFORMAZIONI

inviare una e-mail ai seguenti indirizzi

[assistentsanitari.firenze@
uslcentro.toscana.it](mailto:assistentsanitari.firenze@uslcentro.toscana.it)

[assistentsanitari.mugello@
uslcentro.toscana.it](mailto:assistentsanitari.mugello@uslcentro.toscana.it)

[assistentsanitari.firenzesudest@
uslcentro.toscana.it](mailto:assistentsanitari.firenzesudest@uslcentro.toscana.it)

[assistentsanitari.firenzenordovest@
uslcentro.toscana.it](mailto:assistentsanitari.firenzenordovest@uslcentro.toscana.it)

LE VACCINAZIONI IN GRAVIDANZA



Vacciniamoci per noi stessi e per gli altri

LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE



27-32^a settimana

Ad ogni gravidanza è fortemente raccomandata effettuare la vaccinazione contro la pertosse.

Il vaccino per la pertosse è associato al tetano e alla difterite.

In caso di un'ulteriore gravidanza, anche a distanza di pochi anni, la vaccinazione deve essere effettuata nuovamente, il richiamo sarà comunque servito come rinnovo per la vaccinazione contro il tetano con scadenza decennale.

Periodo influenzale

È fortemente raccomandato l'esecuzione del vaccino contro l'influenza nel periodo influenzale. Nel periodo della campagna antinfluenzale (ottobre-dicembre) in qualsiasi epoca gestazionale.

La vaccinazione anti tetano, difterite, pertosse deve essere ripetuta ad ogni gravidanza, così pure l'antinfluenzale se la gravidanza cade nel periodo epidemico.

I due vaccini, antinfluenzale e antitetano, difterite, pertosse possono essere somministrati nella stessa seduta vaccinale.

Si ricorda che si tratta di vaccini uccisi e di anatossine, e che pertanto non esistono rischi per la loro somministrazione in gravidanza.

PERCHÈ ESEGUIRE LA VACCINAZIONE CONTRO LA PERTOSSE AD OGNI GRAVIDANZA

È importante per permettere alla madre di sviluppare gli anticorpi contro la pertosse e passarli per via transplacentare al feto nelle ultime settimane di gravidanza

Solo così il lattante alla nascita avrà già una protezione iniziale contro tale malattia, che sarà poi rinnovata con la prima vaccinazione che effettuerà dal 61° giorno di vita.

LA STRATEGIA COCOON O DEL BOZZOLO



È una protezione indiretta del bambino e consiste nell'assicurarsi che tutti coloro che incontrano il neonato siano vaccinati.

È, infatti, importante che tutte le persone che si prenderanno cura del bambino/a siano vaccinate, il prima possibile ed almeno due settimane prima del parto, per:

-  Difterite-Tetano-Pertosse
-  Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella
-  Influenza

