

PET GLOBALE CORPOREA CON 18F-FDG per FLOGOSI
(Codice catalogo regionale 9H11)

Sig. _____

appuntamento data _____ ore _____

CHE COS'È, A COSA SERVE E COME SI ESEGUE

Il Medico Nucleare valuta preventivamente la congruità e l'appropriatezza della richiesta dell'esame, sulla base dei dati clinici e del quesito diagnostico proposto (art. 111 D. L. vo 230/95, e D. L. 187/2000). L'indagine PET consiste nella somministrazione per via endovenosa di una piccola dose del radiofarmaco 18F-Fluorodeossiglucosio (18F-FDG), uno zucchero reso debolmente radioattivo, e nel successivo studio della sua distribuzione nell'organismo con l'ausilio di un macchinario denominato tomografo PET (Tomografia ad emissione di Positroni). Poiché le cellule infiammatorie presentano un incremento del metabolismo del glucosio rispetto alle cellule sane, questo esame permette di ottenere informazioni nel caso di patologia infiammatoria (spondilodisciti di origine ematogena/disciti/spondiliti, febbre di ndd, endocarditi su protesi valvolari, infezioni da apparecchiature mediche elettroniche a resistenza, identificazione di eventi embolici settici, vasculiti dei grossi vasi, protesi/endoprotesi vascolari, sarcoidosi, infezioni). L'esecuzione avviene mediante distensione del paziente in posizione supina sul lettino del tomografo. Per la buona riuscita dell'esame è necessario ridurre al minimo i movimenti durante l'esecuzione dello stesso, per cui chiediamo al paziente di mantenere la posizione che viene indicata dal tecnico sanitario.

LA PET È DOLOROSA O PERICOLOSA?

No, non è dolorosa: l'unico disagio è il fastidio provocato dalla puntura dell'ago durante l'iniezione endovenosa del radiofarmaco.

Non è pericolosa: viene iniettata una piccola quantità di radioattività; la dose di radiazioni assorbite è paragonabile a quella dei più comuni esami radiologici. Le sostanze utilizzate non sono tossiche e non provocano generalmente effetti secondari, le manifestazioni allergiche sono del tutto eccezionali.

CI SONO CONTROINDICAZIONI?

Sì, occorre avvertire il medico, prima della esecuzione dell'indagine, riguardo un'eventuale GRAVIDANZA, presunta o accertata, poiché essa controindica l'esecuzione dell'indagine. Dunque, le donne in età fertile, che si sottopongono a tale tipo di esame, nel loro interesse e in quello del nascituro, devono tempestivamente comunicare un eventuale stato di gravidanza presunta o accertata¹. Occorre avvertire il medico anche in caso di un eventuale stato di ALLATTAMENTO di un neonato per indicazioni specifiche al riguardo.

[A] PREPARAZIONE PRE-ESAME PER APPUNTAMENTI PET IN SOSPETTA ENDOCARDITE

[DA ESEGUIRE ENTRO 48 h prima della esecuzione dell'esame]

- CIBI NON PERMESSI – cibi contenenti carboidrati o zuccheri (latte, formaggio, pane, cereali, biscotti, toast, cracker, muffin, burro di arachidi, noci, succo di frutta, caramelle, frutta, riso, gomma da masticare, mentine, fagioli, alcool);
- CIBI PERMESSI – grassi non dolcificati (fritti o arrostiti, non grigliati), pollo, tacchino, pesce, carni (prosciutti, salsiccia, etc), uova, bevande senza latte e zuccheri, caffè senza latte e zuccheri, acqua, dolcificante.

[B] PREPARAZIONE PRE-ESAME IN TUTTI GLI ALTRI CASI (VASCULITI ETC)

[B1] PREPARAZIONE PRE-ESAME PER APPUNTAMENTI PET DI MATTINA

- Diggiuno DA ALMENO 6 ORE e bere solo acqua PRIMA dell'esecuzione della PET
- La sera precedente NON dovrà assumere carboidrati (pane, pasta, riso, zucchero, fette biscottate) ma si dovranno assumere cibi grassi e proteine (uova, carne, pesce, frutta, verdura)
- In caso di diabete informare il personale sia al momento della prenotazione sia in fase di accettazione, in quanto deve essere concordata una specifica somministrazione di insulina (fare colazione ed assumere regolarmente insulina o ipoglicemizzanti come da prescrizione medica almeno 4 ore PRIMA dell'esame)
- Glicemia < 126 mg/dL ed evitare attività fisica intensa il giorno prima dell'esame
- Per l'esame basale, entro 3 gg dall'inizio della terapia steroidea

- Per la valutazione di risposta alla terapia, 20 - 30 giorni dalla sospensione della terapia
- Segnalare claustrofobia, difficoltà a mantenere la posizione ed eventuali difficoltà ad urinare
- Segnalare eventuale riduzione del grado di autonomia e/o autosufficienza

[B2] PREPARAZIONE PRE-ESAME PER APPUNTAMENTI PET DI POMERIGGIO

- Digiuno DA ALMENO 6 ORE e bere solo acqua PRIMA dell'esecuzione della PET
- Al mattino, prima del digiuno di 6 ore antecedente l'esame, è possibile fare una colazione leggera a base di latte, yogurt, cibi grassi e proteine (uova, carne, pesce, frutta e verdura). Da EVITARE l'assunzione di carboidrati (pane, pasta, riso, zucchero, fette biscottate).
- In caso di diabete informare il personale sia al momento della prenotazione sia in fase di accettazione, in quanto deve essere concordata una specifica somministrazione di insulina (fare colazione ed assumere regolarmente insulina o ipoglicemizzanti come da prescrizione medica almeno 4 ore PRIMA dell'esame)
- Glicemia < 126 mg/dL
- Evitare attività fisica intensa il giorno prima dell'esame
- Per l'esame basale, entro 3 gg dall'inizio della terapia steroidea
- Per la valutazione di risposta alla terapia, 20 - 30 giorni dalla sospensione della terapia
- Segnalare claustrofobia, difficoltà a mantenere la posizione ed eventuali difficoltà ad urinare
- Segnalare eventuale riduzione del grado di autonomia e/o autosufficienza

INDICAZIONI PER IL GIORNO DELL'ESAME

- Rispettare l'orario di appuntamento; presentarsi con la richiesta medica e con vestiti comodi, privi di accessori metallici (ad esempio una tuta da ginnastica); portare in visione la documentazione disponibile (cartelle e relazioni cliniche, TAC, RMN, Ecografie, etc)

DURATA COMPLESSIVA DELL'ESAME

La sua permanenza all'interno della Medicina Nucleare per la completa esecuzione dell'indagine richiede circa 150 minuti. Dopo la fase di accettazione, il Medico Nucleare provvede a raccogliere le informazioni riguardo la storia clinica e le firme del paziente sui moduli "Informativa Paziente" e "Consenso Informato". Al paziente viene poi misurata la glicemia che deve essere nel range di normalità per poter eseguire l'indagine PET. Al paziente viene somministrato il radiofarmaco per via endovenosa. Dopo l'iniezione, si deve attendere circa 60 – 90 minuti che il radiofarmaco si distribuisca all'intero organismo. Durante questo tempo, il paziente attende su una poltrona all'interno di una saletta dedicata. Al termine dell'attesa il paziente viene invitato a distendersi sul lettino tomografico. Ha quindi inizio la registrazione delle immagini diagnostiche (circa 30 minuti).

AL TERMINE DELLA PET

- Il paziente può lasciare il servizio solo se preventivamente autorizzato dal personale sanitario
- Evitare di stare in contatto con bambini e donne in gravidanza nelle prime 12 ore dopo l'esame
- È importante, per motivi radioprotezionistici, che il paziente assuma liquidi in abbondanza per le ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo

ALTERNATIVE

Non esistono alternative diagnostiche in grado di fornire le stesse informazioni.

Se quanto illustrato in questo foglio non è chiaro o se si necessita di ulteriori informazioni è opportuno chiedere chiarimenti al medico prima di iniziare l'esame

Può contattare il personale della SOC Medicina nucleare telefonando al 0574 80-1873/1874/1862

Data _____

Firma medico _____

Firma paziente _____

¹ Le radiazioni ionizzanti possono causare delle alterazioni genetiche e/o cromosomiche, in modo particolare nelle cellule con spiccata attività di riproduzione. Le cellule embrionali (primi 3 mesi di gravidanza) e quelle fetali (dal 3° al 9° mese) in minor misura, solo cellule particolarmente sensibili alle radiazioni ionizzanti